

肉 豚 生 産 工 程 報 告 書

No. 1

2009年1月1日

会 社 名	株式会社 ポーク (下須戸農場)				
本 社 住 所	埼玉県羽生市須影 4 6 8				
TEL ・ FAX	TEL 0 4 8 - 5 6 1 - 8 0 2 3 FAX 0 4 8 - 5 6 3 - 2 2 1 9				
代 表 者 名	高鳥 千枝子				
農 場 住 所	埼玉県行田市下須戸字長田 5 2 0				
農場TEL・FAX	TEL 0 4 8 - 5 5 9 - 2 5 7 8 FAX 0 4 8 - 5 5 9 - 2 5 7 9				
飼 養 形 態	繁殖専用				
品 種	交雑種 LW×D				
飼 料 情 報	協同飼料 ・ 日本養豚事業協同組合 ・ 東日本くみあい				
ス テ ー ジ	育 成 豚 用	妊 娠 期 用	授 乳 期 用	子 豚 用	子 豚 用
飼 料 名	ハヤト	ロイヤルライフ	ロイヤルラクト	ゆめ人工乳10	ゆめ子豚20
ス テ ー ジ	代 用 乳 ・ 人 工 乳			種 雄 豚 用	肥 育 用
飼 料 名	ママ7アクトW、ママ7ホップW			ロイヤルライフ	ハヤト

予防プログラム (ワクチンプログラム・抗菌剤等添加プログラム)

畜 種	薬 品 名	使 用 目 的	用 法	1 頭当投与量	使用時期・期間
哺乳豚	アイソゾフ	貧血防止	筋肉注射	2 . 0 m l	出生時
哺乳豚	ペニシリン	感染予防	筋肉注射	1 . 5 万単位	断尾・去勢時
離乳豚	レスピフェンド	予防接種	筋肉注射	2 . 0 m l	3 ・ 6 週令
子豚	ポーシリスAD	予防接種	筋肉注射	0.5 d o s e	9 週令
子豚	ポーシリスAPP	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	9 週令
子豚	ポーシリスERY	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	9 週令
子豚	タイラン	感染予防	飼料添加	0,50%	間欠投与
子豚	S T 散	感染予防	飼料添加	0,50%	間欠投与
母豚 (妊娠期)	インゲル [®] ヲ PRRS	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	交配後 7 ~ 8 週
母豚 (妊娠期)	スイムジェン	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	分娩 5 週前
母豚 (妊娠期)	ポーシリスAD	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	分娩 4 週前
母豚 (妊娠期)	タナメックス	駆虫薬	筋肉注射	6 . 0 m l	分娩 2 週前
母豚 (妊娠期)	日本脳炎ワクチン	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	6 ~ 9 月 3 産以下
母豚 (授乳期)	リンコミックス44	感染予防	飼料添加	0,20%	授乳期連投
種雄・母豚授乳期	オテラフィート	感染予防	飼料添加	0,30%	間欠投与

予防プログラム以外に使用する薬品

ステージ種別	薬 品 名	使 用 目 的	用 法	1 頭当投与量	使用時期・期間
哺乳豚	エクセネル	下痢治療	筋肉注射	5 m g (力価)	生後 1 週間 ~ 10 日
離乳豚	トリオプリン	感染拡大予防	筋肉注射	2 . 0 m l	生後 3 週令

肉 豚 生 産 工 程 報 告 書

No.2

2009年1月1日

会 社 名	株式会社 ポーク (熊谷農場)				
本 社 住 所	埼玉県羽生市須影 4 6 8				
TEL ・ FAX	TEL 0 4 8 - 5 6 1 - 8 0 2 3 FAX 0 4 8 - 5 6 3 - 2 2 1 9				
代 表 者 名	高鳥 千枝子				
農 場 住 所	埼玉県熊谷市下川上 4 2 5 - 6				
農場TEL・FAX	TEL 0 4 8 - 5 2 5 - 3 3 9 4 FAX 0 4 8 - 5 2 5 - 3 4 9 4				
飼 養 形 態	肥育専用				
品 種	交雑種 LW×D				
飼 料 情 報	日本養豚事業協同組合				
ス テ ー ジ	種 雄 豚 用	育 成 豚 用	繁 殖 豚 用	妊 娠 期 用	授 乳 期 用
飼 料 名					
ス テ ー ジ	代用乳・人工乳	子 豚 用	子 豚 用	肥 育 用	その他
飼 料 名		ゆめ子豚20	ゆめ子豚40	ゆめ子豚60	

予防プログラム (ワクチンプログラム・抗菌剤等添加プログラム)

畜 種	薬 品 名	使 用 目 的	用 法	1 頭当投与量	使用時期・ 期間
肉 豚	ポーシリスAD	予防接種	筋肉注射	0.5 d o s e	1 4 週令
肉 豚	ポーシリスAPP	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	1 4 週令
肉 豚	ポーシリスERY	予防接種	筋肉注射	1 d o s e	1 4 週令
肉 豚	メイポール	駆虫剤	飼料添加	0,10%	導入～5週間
肉 豚	S T 散	感染予防	飼料添加	0,40%	導入～5週間
肉 豚	ドキシサイリン	感染予防	飼料添加	0,50%	1 7 ・ 1 9 週令

予防プログラム以外に使用する薬品

ステージ種別	薬 品 名	使 用 目 的	用 法	1 頭当投与量	使用時期・ 期間
肉 豚	ペニシリン	治療	筋肉注射	3 . 0 m l	症状発生時
肉 豚	水性アンピシリン	治療	筋肉注射	3 . 0 m l	症状発生時
肉 豚	リンコミックス44	治療	飼料添加	0,50%	症状発生時
肉 豚	タイロシン	治療	飼料添加	0,50%	症状発生時
肉 豚	オテラフィド	治療	飼料添加	0,50%	症状発生時